


โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies virus ติดต่อในสัตว์เลือดอุ่น
รวมถึงคนด้วย ผู้ที่เป็นโรคมีอัตราการเสียชีวิต 100%



อันดับ 1
สุนัข



อันดับ 2
แมว



ลิง



กระรอก



หนู อื่น ๆ

เมื่อไหร่ ต้องฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดก่อนสัมผัสสัตว์



ฉีดหลังสัมผัสสัตว์

ต้องฉีดในกรณีนี้

ทำในผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกสัตว์กัด
เช่น สัตวแพทย์ เด็ก หรือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า

1. ถูกจับเป็นรอยขีด
2. น้ำลายของสัตว์ถูกผิวหนัง
ที่มีรอยถลอกหรือมีแผล
3. ถูกข่วนที่ผิวหนัง
4. ถูกกัดเป็นแผล
5. น้ำลายหรือเลือด
จากร่างกายสัตว์ ซากสัตว์
ถูกเย็บตา จมูกและแผล

